

INFORMATION : SCARLATINE

Nous vous faisons part des informations regardant cette maladie.

Définition :

Infection de la gorge causée par une bactérie appelée streptocoque.
Si l'infection s'accompagne d'une éruption cutanée, il s'agit d'une scarlatine.

Période d'incubation :

De 1 à 5 jours.

Période de contagiosité :

Rarement plus de 24 heures après le début du traitement antibiotique.
Si non traitée, de 10 à 21 jours.

Durée de la maladie :

Rarement plus de 7 jours.

Mode de transmission :

Le plus souvent par contact direct avec des gouttelettes provenant du nez et de la gorge des personnes infectées ou porteuses du germe. Rarement par l'ingestion d'aliments contaminés.

Symptômes :

Pharyngite, amygdalite : fièvre, maux de gorge, nausées et vomissements, enflure des ganglions au niveau du cou.

Scarlatine : aux symptômes de la pharyngite ou de l'amygdalite s'ajoutent une langue framboisée et une éruption (qui blanchit sous la pression) apparaissant au cou, à la poitrine, aux plis des coudes, des genoux, des aines, suivie d'une desquamation (peau qui pèle).

Traitement :

Antibiotique par la bouche. Repos, boire plus de liquide, diète molle et froide.
Un traitement adéquat prévient des complications.

Prévention et mesures de contrôle :

Exclure l'enfant jusqu'à 24 heures après le début du traitement et jusqu'à ce que son état lui permette de suivre les activités. Informer tous les parents. Si apparition des symptômes chez les contacts, diriger vers le médecin ou le CLSC pour évaluation et culture de gorge.

Si votre enfant a la scarlatine, veuillez en aviser le CPE ou le service de garde en milieu familial le plus rapidement possible.

Si vous avez des questions vous pouvez contacter InfoSanté au 699-3333.
Merci de votre attention.